

IBUPIRAC PEDIATRICO. Ibuprofeno 120 mg. Comprimidos recubiertos. Venta libre. Elaborado en Argentina.

¿QUÉ CONTIENE IBUPIRAC PEDIÁTRICO?: Cada comprimido recubierto contiene: IBUPROFENO 120 mg. Exc.: c.s.

ACCIONES (Acción terapéutica): Calma el dolor, reduce la inflamación y baja la fiebre. **¿PARA QUE SE USA IBUPIRAC PEDIÁTRICO?:** está indicado para el alivio sintomático de fiebre, dolor leve a moderado, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolor asociado a los estados gripales, dolor dental, dolores de las articulaciones, dolor de garganta.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO? Se recomienda tomar la dosis cada 6 a 8 horas.

Edad aproximada según peso	Como dosis media de orientación se sugiere: Peso del niño	Temperatura mayor o igual a 38 grados axilar	Dosis máxima recomendada por día
Desde 2 años	Hasta 12 kg	1 IBUPIRAC PEDIÁTRICO	4 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
3 a 6 años	13 a 24 kg	2 IBUPIRAC PEDIÁTRICO	8 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
7 a 10 años	25 a 30 kg	2 y ½ IBUPIRAC PEDIÁTRICO	10 IBUPIRAC PEDIÁTRICO
Más de 10 años	31 a 36 kg	3 IBUPIRAC PEDIÁTRICO	10 IBUPIRAC PEDIÁTRICO

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPIRAC PEDIÁTRICO?

NO USE este medicamento si usted: es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios o a algún componente del medicamento, si padece insuficiencia hepática y renal, si tiene antecedentes de síndrome de poliposis nasal, asma, angioedema o broncoespasmo inducidos por aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides, si tiene úlcera gastroduodenal activa, falla cardíaca severa y/o lupus eritematoso sistémico. NO USE este medicamento durante el último trimestre del embarazo.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? (Advertencias y precauciones de uso)

Consulte a su médico si: El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos colaterales severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio en el término de 1 día de tratamiento, o el dolor o la fiebre empeoran, está deshidratado debido a vómitos continuos, diarrea o falta de ingesta de líquidos. En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción. El dolor de garganta es severo, dura más de 2 días con igual intensidad o se presenta con fiebre, dolor de cabeza, erupción, náuseas y/o vómitos. Aparecen nuevos síntomas. Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Salvo que lo indique el médico, no utilizar: Combinado con cualquier otro producto que contenga ibuprofeno, o cualquier otro analgésico y/o antifebril; para el dolor de estómago, durante más de 3 días para la fiebre y 5 días para el dolor. Este producto contiene aspartame, por lo tanto no debe ser administrado a pacientes fenilcetonúricos.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO? En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago, dispepsia), erupción cutánea, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y cefaleas. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

FORMA DE CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura menor a 25°C.

PRESENTACION: Envase con 20 comprimidos recubiertos. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No utilizar después de la fecha de vencimiento. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.** EMAMS Cert. N° 35.918. PFIZER S.R.L. Virrey Loreto 2477, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. D.T: Sandra Maza, Farm. Fecha última revisión: Mayo 2013 (1.0). Para mayor información respecto al producto, comunicarse al teléfono (011) 4788-7000.