

IBUPIRAC Ibuprofeno 400 mg - Comprimidos. Industria Argentina. Venta Libre.

COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 400 mg. Exc.: c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Analgésico, antiinflamatorio y antifebril. **INDICACIONES:** alivio sintomático de: Dolores musculares, Dolores de espalda, Fiebre Dolores de cabeza, Dolor asociado a los estados gripales, Dolores menstruales, Dolores de dientes, Dolores producidos por artritis. **COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:** Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 a 8 horas La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos (1200 mg/día). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas. Mayores de 65 años: consulte a su médico. Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES: Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la disminución de la fiebre. Si los síntomas continúan o aparece cualquier otro síntoma nuevo, si el dolor o la fiebre continúan o empeoran o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar a su médico. Consulte al médico antes de tomar ibuprofeno si Ud. sufre de hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o de úlcera gástrica o duodenal. Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. Si Ud. consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si Ud. padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc., deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

REACCIONES ADVERSAS: Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas. **CONSERVACIÓN:** Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25°C. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No utilizar después de la fecha de vencimiento. **PRESENTACIÓN:** Envases con 10, 20, 50 y 100 comprimidos.

E.M.A.M.S. Cert. N° 35.918. PFIZER S.R.L. Virrey Loreto 2477, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. D.T.: Sandra B. Maza - Farm.

Para mayor información respecto al producto, comunicarse al teléfono: (011) 4788-7000

Fecha última revisión: Dic 2007