

IBUPIRAC FEM - IBUPROFENO - HOMATROPINA

Comprimidos recubiertos. Industria Argentina. Venta libre

COMPOSICION: Cada comprimido recubierto contiene: IBUPROFENO 400 mg, METILBROMURO DE HOMATROPINA 4 mg. Exc: c.s. **ACCION TERAPEUTICA:** Analgésico. Antiinflamatorio.

Antiespasmódico. **INDICACIONES:** alivio sintomático de: Dolor menstrual (Dismenorrea), Espasmos dolorosos que afecten los aparatos genitourinario, gastrointestinal y la vía biliar. **COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:** Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 8 horas. La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos. No utilice este medicamento por más de 5 días para el alivio del dolor. Si presenta ardor, malestar y/o dolor de estómago es conveniente ingerir los comprimidos con los alimentos o con leche. Si los síntomas (dolor, malestar o espasmos dolorosos) persisten o empeoran por mas de 48 horas, consulte a su medico. **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

Si Ud. padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc., deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor.

Las personas con alteraciones en la coagulación o bajo tratamiento con anticoagulantes orales o heparina, o que padezcan asma o hipertiroidismo deben consultar a su médico antes de utilizar este medicamento. Consulte al médico antes de tomar IBUPIRAC FEM si Ud. sufre de hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o tiene antecedentes de úlcera gástrica o duodenal. Ibupirac Fem no está recomendado durante el embarazo y la lactancia. Dado que contiene metilbromuro de homatropina, se aconseja no utilizarlo conjuntamente con: antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, amantadina o medicamentos para la enfermedad de parkinson. **CONTRAINDICACIONES:** alergia al ibuprofeno, a la aspirina, a la homatropina o butil-bromuro de hioscina (escopolamina), a otros analgésicos antiinflamatorios, o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Antecedentes de úlcera péptica o hemorragia digestiva, glaucoma de ángulo estrecho, estenosis pilórica, obstrucción intestinal, íleo paralítico, colitis ulcerosa, hipertrofia prostática, miastenia gravis, insuficiencia hepática o renal.

REACCIONES ADVERSAS: Ocasionalmente alteraciones gastrointestinales, mareos, cefaleas, erupciones en la piel, picazón, sequedad de boca, disminución de los movimientos gastrointestinales y constipación. **CONSERVACION:** Conservar en lugar seco y fresco, la temperatura no superior a 25°C. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No utilizar después de la fecha de vencimiento. Ante cualquier duda consulte a su médico y/ o farmacéutico.** **PRESENTACIONES:** Envases con 8 y 40 comp. rec. E.M.A.M.S. Certificado N° 43.537. PFIZER SRL Virrey Loreto 2477, Bs. As, Argentina. DT: Sandra Maza, Farm. Rev: Abril 07. Para mayor información respecto al producto, comunicarse al teléfono (011) 4788-7000