

### **IBUPIRAC PLUS - IBUPROFENO - CAFEINA.**

Comprimidos recubiertos. Industria Argentina. Venta Libre.

Cada comp. rec. contiene: IBUPROFENO 400 mg, CAFEINA 65 mg. Exc: c.s.

**Analgésico, antiinflamatorio y antifebril. INDICACIONES:** está indicado para el alivio temporario de afecciones dolorosas y/o febriles: Dolores musculares y de espalda, Fiebre, Dolores de cabeza, Dolores asociados al resfrío común y estados gripales, Dolores de dientes. **COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:** Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comp/8 hs. La dosis diaria no debe superar los 3 comp. (1200 mg/día de ibuprofeno). No utilice este medicamento por más de 5 días para el alivio del dolor o, por más de 3 días, para la disminución de la fiebre. Si presenta ardor, malestar y/o dolor de estómago es conveniente ingerir los comprimidos con los alimentos o con leche. Si los síntomas estomacales empeoran o continúan, consulte a su médico. **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

*Si Ud. padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc., deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor.*

No utilice este medicamento si Ud. tiene alergia al ibuprofeno, a la aspirina, a la cafeína, a otros analgésicos antiinflamatorios, o a alguno de los componentes de la fórmula. Consulte al médico si Ud. sufre de hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o tiene antecedentes de úlcera gástrica o duodenal. Si aparece cualquier síntoma nuevo, si el dolor o la fiebre continúan o empeoran, o si la zona de dolor está roja o hinchada, deberá consultar a su médico. Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. Si Ud. consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día consulte a su médico antes de tomar ibuprofeno u otros analgésicos/antifebriles. Evitar el consumo conjunto con alimentos o bebidas que contengan cafeína: bebidas cola, café, té, mate, chocolate, etc. Los niños menores de 15 años no deberían recibir este medicamento sin consultar previamente al médico. **Si usted está tomando otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. Interacciones con otros medicamentos.** Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos. **CONTRAINDICACIONES:** No utilice este medicamento si Ud. presenta: alergia al ibuprofeno, a la aspirina, a la cafeína, a otros analgésicos antiinflamatorios, o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Insuficiencia hepática y renal. **REACCIONES ADVERSAS:** Este medicamento puede producir náuseas, acidez, disminución en el número de plaquetas, erupción, picazón, urticaria, dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas. También excitación nerviosa, insomnio y palpitaciones. **CONSERVACION:** Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 30°C. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No utilizar después de la fecha de vencimiento. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. PRESENTACION:** Envases con 10 comp. rec. E.M.A.M.S. - Cert. N°43.648. PFIZER SRL, Virrey Loreto 2477, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. DT: Farm. Sandra B. Maza. Para mayor información respecto al producto comunicarse al teléfono (011) 4788-7000. Rev: Noviembre 2007 (1.0).