

IBUPIRAC - IBUPROFENO 400 mg. Cápsulas blandas. Venta Libre. Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 400 mg. Exc.: c.s. **ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Analgésico, antiinflamatorio y antifebril. **USO DEL MEDICAMENTO:** LEA **DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.** **INDICACIONES:** Ibupirac está indicado para el alivio sintomático de: dolores musculares, dolores de espalda, fiebre, dolores de cabeza, dolor asociado a los estados gripales, dolores menstruales, dolores de dientes, dolores producidos por artritis. **COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:** *Adultos y niños mayores de 15 años:* 1 cápsula blanda cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan. La dosis diaria no debe superar las 3 cápsulas blandas (1200 mg/día). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas. *Mayores de 65 años:* consulte a su médico. *Niños menores de 15 años:* consulte con su médico. **CONTRAINDICACIONES:** Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal. **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:** No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o por más de 3 días para la disminución de la fiebre. Si los síntomas continúan o aparece cualquier otro síntoma nuevo, si el dolor o la fiebre continúan o empeoran o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar a su médico. Consulte al médico antes de tomar ibuprofeno si Ud. sufre de hipertensión arterial y/ o insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado o riñón o de úlcera gástrica o duodenal. Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. Si Ud. consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si Ud. padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc., deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

REACCIONES ADVERSAS: Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas. **CONSERVACION:** Conservar en lugar seco y fresco, a temperatura no superior a 25°C. **MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No utilizar después de la fecha de vencimiento. **ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.** **PRESENTACION:** Envases con 10, 20 y 50 cápsulas blandas. EMAMS Cert. N° 35.918. Industria Brasileña. Importado por PFIZER S.R.L. Virrey Loreto 2477, Ciudad de Bs. As., Argentina. D.T: Sandra B. Maza - Farm. Para mayor información respecto al producto comunicarse al teléfono: (011) 4788-7000. Rev: Sep 2009